

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:レクシヴァ錠 700

主成分 :ホスアンプレナビルカルシウム水和物(Fosamprenavir calcium hydrate)

剤型 :淡紅白色の錠剤、長径 20.5mm、短径 9.5mm、厚さ 7.4mm

シート記載:

**この薬の作用と効果について**

体内で活性体になり HIV プロテアーゼを阻害して、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の増殖を抑制して、免疫機能の低下、体重減少、リンパ球腫脹や日和見感染症など病気の進行を遅らせます。

通常、HIV 感染症の治療に用いられますが、必ず他の抗 HIV 薬が併用されます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬を使っている(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください)。

用法・用量(この薬の使い方)

・初めて抗 HIV 薬で治療する:以下の1法、2法、3法のいずれかの用法が指示されます。1法—通常、成人は1回1錠(ホスアンプレナビルとして700mg)と、リトナビル100mgを1日2回同時に服用します。2法—通常、成人は1回2錠(1,400mg)と、リトナビル100mgまたは200mgを1日1回同時に服用します。3法—通常、成人は1回2錠(1,400mg)を1日2回服用します。

HIV プロテアーゼ阻害剤の投与経験がある:通常、成人は1回1錠(ホスアンプレナビルとして700mg)と、リトナビル100mgを1日2回同時に服用します。

いずれの場合も、必ず指示された服用方法に従ってください。

- ・飲み忘れた場合は、気がついた時点ですぐに服用してください。ただし、次に服用する時間が近い場合は、1回飛ばして次の通常の服用時間に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに自分の判断で飲むのを止めないでください。自覚症状がなくなったからといって、薬を途中でやめると病気が悪化することがあります。

生活上の注意

- ・服薬量が適当か、また、自分の気づかない副作用が発生していないか確認するために、定期的に検査が行われるので、指示された受診を守ってください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと(副作用)

主な副作用として、下痢、吐き気、嘔吐などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・重度の発疹、全身的症状または粘膜症状を伴う発疹[皮膚粘膜眼症候群]
- ・口渇、多尿、易疲労感[高血糖、糖尿病]
- ・皮下出血、鼻血、血尿[出血傾向]
- ・手足がしびれる、尿が赤褐色になる、筋肉が痛い[横紋筋融解症、筋炎、筋痛、CK(CPK)上昇]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局に相談してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。