


薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名：ノープリア錠 100mg 主成分：リトナビル（Ritonavir） 剤形：白色の錠剤 直径（長さ）：約 17mm 厚さ：約 6mm シート記載：	
この薬の作用と効果について HIV(ヒト免疫不全ウイルス)の産生/増殖を抑える薬です	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。 ・ 肝機能障害がある ・ 血友病及び出血傾向がある ・ 妊娠または授乳中 ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。 	
用法・用量（この薬の使い方） <ul style="list-style-type: none"> ・ 通常、成人は1回6錠（リトナビルとして600mg）を1日2回食後に服用します。ただし、服用初日は1回3錠（300mg）を1日2回、2日目、3日目は1回4錠（400mg）を1日2回、4日目には1回5錠（500mg）を1日2回、5日目以降は1回6錠（600mg）を1日2回食後に服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。 ・ 飲み忘れた場合は気がついたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合には、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばしてください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。 ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 	
生活上の注意 <ul style="list-style-type: none"> ・ この薬は食事により吸収が影響されます。必ず食後に服用してください。 	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、嘔気、下痢、異常感覚、嘔吐、口周囲感覚異常、肝機能異常、食欲不振、味覚倒錯、CK上昇、倦怠感などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。	
まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 考えがまとまらない、時間、場所などがわからない、幻覚、筋肉が発作的に収縮する〔錯乱、痙攣発作〕 ・ 過呼吸、意識障害、手指の震え〔脱水〕 ・ 喉がかわく、大量の水を飲む、尿量の増加、疲れやすい、体重減少〔高血糖、糖尿病〕 ・ 食欲不振、全身がだるい、吐き気、嘔吐、皮膚や結膜などが黄色くなる、意識障害〔肝炎、肝不全〕 ・ 呼吸困難、蕁麻疹、全身がだるい〔過敏症〕 ・ 皮下出血、鼻血、歯ぐきの出血などの出血しやすい状態〔出血傾向〕 	
以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法その他 <ul style="list-style-type: none"> ・ 気密容器に入れ、冷蔵庫で保存してください 	
医療担当者記入欄 年 月 日	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。

また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。