

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：カレトラ錠

主成分：ロピナビル（Lopinavir）

リトナビル（Ritonavir）

剤形：黄色のフィルムコート錠 長径：約 19mm 短径：約 10mm 厚さ：約 8mm

シート記載：シートなし



この薬の作用と効果について

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)の産生/増殖を抑える薬です。ロピナビルは HIV プロテアーゼの活性を阻害し、リトナビルはロピナビルの血中濃度を上昇させます。

通常、HIV 感染症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用し、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝機能障害、血友病及び出血傾向がある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ 通常、成人および体重 40kg 以上の小児は 1 回 2 錠を 1 日 2 回服用します。食事の有無に関わらず服用できます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は気がついたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合には、忘れた分は飲まないで 1 回分を飛ばしてください。絶対に 2 回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ セイヨウオトギリソウ含有食品はくすりの代謝を促進して効果を弱めるおそれがあるので、この薬を服用中は服用しないでください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、下痢・吐き気・力が入らないなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 口渇、多飲、多尿 [高血糖、糖尿病]
- ・ 嘔吐、腹痛 [膵炎]
- ・ 皮下出血、鼻血、歯ぐきの出血などの出血しやすい状態 [出血傾向(血友病の場合)]
- ・ 全身倦怠感、食欲不振、皮膚や結膜などが黄色くなる [肝機能障害]
- ・ 息切れ、めまい、腹部不快感 [徐脈性不整脈]
- ・ 関節痛、眼球結膜の充血 [多形紅斑、皮膚粘膜眼症候群]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。

- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局に相談してください。

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。