

くすりのしおり

620005884

2011年6月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：プリジスタ錠 300mg

主成分：ダルナビル エタノール付加物（Darunavir ethanolate）

剤形：だいたい色の錠剤、長径 17.3mm、短径 8.6mm、厚さ 5.5mm

シート記載：TMC114



この薬の作用と効果について

HIV-1 プロテアーゼ阻害剤で、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）の増殖を抑制し、病気の進行を遅らせます。他の HIV プロテアーゼ阻害剤（リトナビルなど）との併用で相乗作用を示し、リトナビルはこの薬の血中濃度を上げます。

通常、リトナビルおよび他の抗 HIV 薬と併用し、抗 HIV 薬の治療経験があり、この薬の耐性がある HIV 感染症の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝障害、血友病、出血傾向がある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ 通常、成人は1回2錠（ダルナビルとして600mg）と他にリトナビルとして100mgを1日2回、同時に食事中または食直後に服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れると効き目がなくなるおそれがあるために飲み忘れないことが大切です。飲み忘れに気付いた時は、飲み忘れた分は飲まず、次の食事の時に飲んでください。ただし、この時2回分の4錠をまとめて飲まず、通常の1回分の2錠を飲んでください。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- ・ セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）は薬の血中濃度を下げ、効果が減弱するおそれがあるので、セイヨウオトギリソウ含有食品を避けてください。
- ・ 浮動性めまいが報告されているので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作には注意してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、下痢、吐き気、頭痛、発疹などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[] 内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 高熱（38℃以上）、眼の充血、口や唇のただれ、赤い発疹〔中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑〕
- ・ 体がだるい、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる〔肝機能障害、黄疸〕
- ・ 激しい上腹部の痛み、腰背部の痛み、吐き気〔急性膵炎〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局に相談してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。